

婴儿和儿童(年龄 0-10 岁)疫苗接种

给您的孩子及时接种疫苗将有助于保护他或她免受
18 种疫苗可预防的疾病。询问您孩子的医务人员, 您的
孩子是否已经注射了所有截至目前为止应注射的疫苗。

疫苗	您的孩子是否已经注射了所有截至目前为止应注射的疫苗?
水痘 (水痘; Var)	您的孩子需要注射 2 剂水痘疫苗。第一剂在出生 12-15 个月时注射, 第二剂在 4-6 岁时注射。
新冠肺炎 (COVID-19)	根据目前 CDC 的建议, 年满 6 个月的儿童都需要接种新冠肺炎疫苗。该疫苗可预防儿童新冠肺炎引起的罕见但严重的并发症。
白喉、破伤风和百日咳 (百日咳; DTaP)	您的孩子需要注射 5 剂 DTaP 疫苗。第一剂在出生 2 个月时注射, 第二剂在 4 个月时注射, 第三剂在 6 个月时注射, 第四剂在 15-18 个月时注射, 第五剂在 4-6 岁时注射。
乙型流感嗜血杆菌 (Hib)	您的孩子需要注射 3-4 剂 Hib 疫苗, 注射次数依据疫苗品牌而定。第一剂在出生 2 个月时注射, 第二剂在 4 个月时注射, 第三剂在 6 个月时注射 (如果需要), 最后一剂在 12-15 个月时注射。
甲型肝炎 (HepA)	您的孩子需要注射 2 剂甲型肝炎疫苗。第一剂在 1 岁时注射, 第二剂在之后的 6-18 个月时注射。
乙型肝炎 (HepB)	您的孩子至少需要注射 3 剂乙型肝炎疫苗, 注射次数依据疫苗品牌而定。第一剂在出生时接种, 第二剂在 1-2 个月时接种, 最后一剂在 6-18 个月时接种。
人乳头瘤病毒 (HPV)	HPV 疫苗通常在儿童 11 或 12 岁时接种, 但也可提前至 9 岁时开始接种。两剂疫苗应间隔 6-12 个月接种。
流感病毒 (流感)	所有年满 6 个月的儿童都需要每年秋季或冬季接种流感病毒疫苗。一些年龄不足 9 岁的儿童需要注射 2 剂。如果您的孩子在这个季节需要接种 1 剂以上, 请咨询您孩子的医务人员。
麻疹、腮腺炎、风疹 (MMR)	您的孩子需要注射 2 剂 MMR 疫苗。第一剂在出生 12-15 个月时注射, 第二剂在 4-6 岁时注射。
脑膜炎球菌 (MenACWY、MenB)	年龄为 0-10 岁且患有特定健康病症 (比如无功能性脾脏) 的婴儿和儿童需要接种 MenACWY 疫苗; 10 岁以上的儿童则需要接种 MenACWY 和 MenB 疫苗。与您的医务人员交谈, 弄清楚您的孩子是否需要接种脑膜炎球菌疫苗。
肺炎球菌 (结合疫苗 [PCV]; 多糖疫苗, [PPSV23])	您的孩子需要接种 4 剂联合疫苗 (PCV)。第一剂在出生 2 个月时注射, 第二剂在 4 个月时注射, 第三剂在 6 个月时注射, 第四剂在 12-15 个月时注射。一些患有某些疾病的年龄较大的儿童也需要接种额外的肺炎球菌疫苗。请咨询您孩子的医务人员, 了解您的孩子是否需要接种这种额外的疫苗, 以预防肺炎球菌疾病。
小儿麻痹症 (IPV)	您的孩子需要接种 4 剂脊髓灰质炎疫苗 (IPV), 以保护他们免受麻痹性脊髓灰质炎的影响。第一剂在出生 2 个月时注射, 第二剂在 4 个月时注射, 第三剂在 6-18 个月时注射, 第四剂在 4-6 岁时注射。
呼吸道合胞病毒预防 性抗体 (RSV-mAb)	从 10 月到次年 3 月, 如果在怀孕期间没有接种 RSV 疫苗, 新生儿到 7 个月大的婴儿可能需要 RSV 预防性抗体 (RSV-mAb)。某些 8-19 月大的高危婴儿在第二个 RSV 流行季可能需要 RSV-mAb。
轮状病毒 (RV)	您的孩子需要注射 2-3 剂轮状病毒疫苗 (RV), 注射次数依据疫苗品牌而定。第一剂在出生 2 个月时注射, 第二剂在 4 个月时注射, 第三剂 (如果需要) 在 6 个月时注射。

您的孩子将去美国以外的地方旅游吗? 请访问美国疾病控制与预防中心 (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 网站 wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list, 获取旅行信息, 或咨询旅行诊所。

