

임신 중 필요한 백신 접종

아래 표에는 임신 중 필요한 백신 접종과 필요하지 않은 백신 접종이 나와 있습니다.

백신	임신 중 백신을 맞아야 하나?
코로나-19 (COVID-19)	필요함! 임신부와 코로나-19를 앓고 있는 사람들을 포함한 모든 성인들이 최신 코로나-19 백신 접종을 받도록 권장됩니다. 임신 중 언제든지 백신을 접종하는 것이 안전합니다.
인플루엔자 (독감)	필요함! 귀하와 아기를 보호하기 위해 매년 가을이나 겨울에 독감 예방 주사를 맞아야 합니다. 임신 중 언제든지 백신을 접종하는 것이 안전합니다.
파상풍, 디프테리아 및 백일해 (Tdap; Td)	필요함! 모든 임신부는 매임신 중(임신 후기가 바람직함)에 Tdap 백신 1회(성인 백일 기침 백신)를 접종하도록 권장됩니다. 임신 중 Tdap 백신은 출생 후 첫 몇 달 동안 백일 기침 예방에 도움이 됩니다. 지금까지 파상풍 및 디프테리아 독소이드 함유 주사를 3회 이상 맞지 않았거나 깊은 상처나 더러운 상처가 있는 경우 담당 의료서비스 제공자와 상의하십시오.
B형 간염 (HepB)	필요함! 임신부를 포함하여 60세 미만의 모든 성인은 이미 면역이 없는 경우 HepB 백신을 접종받아야 합니다. 임신 중 백신 접종이 필요한 경우, Engerix-B, Recombivax HB, 또는 Twinrix(A형 간염 백신과 조합)을 사용할 수 있습니다. 모유 수유하는 동안 모든 HepB 백신을 사용할 수 있습니다. 백신 접종 상태와 관계없이 모든 임신 기간 동안 B형 간염 감염에 대한 스크리닝 혈액 검사가 권장됩니다.
호흡기 세포융합 바이러스 (RSV)	필요함! 영아의 중대한 RSV 질병을 예방하기 위해, Pfizer RSV 백신(Abrysvo)은 임신 32주 0일에서 36주 6일 사이에 투여하거나 또는 출생 후 영아에게 니르세비맵(RSV 예방제 항체)을 투여해야 합니다. 임신 중 RSV 백신 접종은 일반적으로 9월에서 1월 말 사이에만 제공됩니다.
폐렴구균 PPSV23; PCV15; PCV20	필요할 수 있음. 폐렴구균 질환으로 인한 중증 질환의 위험이 높은 경우, 의료서비스 제공자가 임신 기간 동안 폐렴구균 백신 접종을 권장하거나 임신 후까지 기다리도록 권장할 수 있습니다. 임신 기간 동안 무심코 폐렴구균 백신 접종을 받았더라도 우려할 만한 일은 아닙니다.
A형 간염 (HepA)	필요할 수 있음. A형 간염에 대한 특정 위험* 요인이 있는 경우 이 백신이 필요합니다. 백신은 보통 6~18개월 간격으로 2회 접종합니다. HepA 백신을 연속해서 접종 받거나 계속 접종 받아야 하는 경우, 임신 중에 그렇게 하는 것이 안전합니다.
해모필루스 인플루엔자 b형 (Hib)	필요할 수 있음. 예를 들어, 비장 기능 부전과 같은 특정 고위험 상태*의 일부 성인은 Hib 백신 접종을 받아야 합니다. Hib 백신 접종을 받아야 하는 경우, 임신 중 언제든지 이를 받는 것이 안전합니다.
수막구균 ACWY (MenACWY)	필요할 수 있음. 기숙사에 거주하는 대학 1학년생이고 (1) 16세가 된 후 백신을 접종받지 않았거나 (2) 마지막 접종 후 5년 이상이 지난 경우, MenACWY 백신 접종이 필요합니다. 19세~21세의 사람은 누구나 16세가 지난 후 접종을 하지 않았다면 후속 접종을 받을 수 있습니다. 예를 들어, 비장이 없는 것과 같은 여러 건강 문제* 중 하나가 있는 경우에도 MenACWY 백신 접종을 받아야 할 수 있습니다. 임신 중, MenACWY 접종이 필요한 경우 이를 받는 것이 안전합니다.
수막구균 B (MenB)	필요할 수 있음. 예를 들어, 비장 기능 부전과 같은 여러 건강 문제* 중 하나가 있다면 MenB 백신 접종을 받아야 합니다. 23세 이하인 경우(고위험 질병이 없더라도) 담당 의료서비스 제공자와 상의 후 MenB 백신 접종을 받을 수 있습니다. 임신 중 MenB 백신에 대한 연구가 실시되지 않았기 때문에, 담당 의료서비스 제공자와 백신 접종의 이점과 잠재적 위험에 대해 상의하고 접종 여부를 결정하십시오.
인유두종 바이러스 (HPV)	필요치 않음. 임신 중에 이 백신을 접종하는 것은 권장하지 않지만, 우연히 이 접종을 받았더라도 우려할 만한 일은 아닙니다. HPV 백신은 26세 이하의 모든 사람들에게 권장하며, 귀하가 이 연령대에 속하는 경우 임신 전이나 임신 후에 백신 접종을 받았는지 확인하십시오. 27~45세의 사람들 또한 담당 의료서비스 제공자와 상의 후 HPV 백신을 접종받을 수 있습니다. 백신은 6개월 동안 2회나 3회 투여(첫 번째 백신 투여 시 나이에 따라)합니다.
홍역, 볼거리, 풍진 (MMR)	필요치 않음. 임신 중에 MMR 백신을 접종하는 것은 권장하지 않지만, 무심코 이 접종을 받았더라도 우려할 만한 일은 아닙니다. 1957년 또는 그 이후에 태어난 경우 적어도 1회 MMR 투여를 권장합니다. (그리고 두 번째 MMR을 투여해야 할 수 있습니다.*) 산전 간호 중에, 귀하의 담당 의료서비스 제공자가 귀하의 혈액을 검사하여 분만 후 MMR 접종 필요성을 평가할 것입니다. 임신을 시도하기 전에 귀하(및 미래의 아기)가 백신 예방 접종을 받는 것이 가장 좋습니다.
수두 (Varicella; Var)	필요치 않음. 임신 중에 수두 백신을 접종하는 것은 권장하지 않지만, 무심코 이 접종을 받았더라도 우려할 만한 일은 아닙니다. 수두에 걸린 적이 없거나, 백신 접종을 받은 적이 없거나, 백신 접종을 받았지만 1회 접종만 받은 경우, 임신 시도 전 또는 임신 후에 귀하(및 미래의 아기)가 백신 접종을 받는 것이 가장 좋습니다. 이 백신은 대개 4-8주 간격으로 2회 투여됩니다.
대상포진 (띠헤르페스)	필요치 않음. 50세 이상인 경우, 또는 19-49세이고 면역력이 저하된 경우, Shingrix 브랜드의 대상포진 백신을 2회 연속해서 접종받는 것을 권장합니다. 그러나 임신 중 Shingrix 백신의 안전성은 알려져 있지 않으므로, 담당 의료서비스 제공자와 임신 중 Shingrix 백신 접종의 이점과 잠재적 위험에 대해 상의하고 접종 여부를 결정하십시오.

* 담당 의료서비스 제공자와 상의하여 감염 위험 수준과 이 백신에 대한 필요성을 결정하십시오.

