

¿Cuándo necesitan vacunas los niños y adolescentes?

Edad	HepB Hepatitis B	VRS- AcM	DTaP/Tdap Difteria, tétanos y tosferina (tos convulsa)	Hib <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b	VPI Poliomielitis	PCV Conjugado neumocócico	RV Rotavirus	MMR Sarampión, paperas, rubéola	Varicela	HepA Hepatitis A	COVID-19	Dengue	VPH Virus del papiloma humano	Men- ACWY	MenB	Gripe
al nacer	✓	✓ ² (0-7 meses)														
2 meses	✓		✓	✓	✓	✓	✓									
4 meses	✓ ¹		✓	✓	✓	✓	✓									
6 meses	✓ (6-18 meses)	✓ ² (8-19 meses)	✓	✓ ¹	✓ (6-18 meses)	✓	✓ ¹				✓ ⁴ Se recomienda la vacuna contra el COVID-19 para todas las personas a partir de los 6 meses de edad					✓ (a partir de los 6 meses)
8 meses																
12 meses			✓ ³ (15-18 meses)	✓ (12-15 meses)		✓ (12-15 meses)		✓ (12-15 meses)	✓ (12-15 meses)	✓✓ (2 dosis administradas con 6 meses de diferencia de forma rutinaria de los 12 a los 23 meses de edad)						
15 meses																
18 meses																
19 a 23 meses																Una dosis cada otoño o invierno. Algunos niños menores de 9 años necesitan 2 dosis; pregúntele al proveedor de atención médica de su hijo si necesita más de 1 dosis.
4 a 6 años			✓		✓			✓	✓							
7 a 10 años																
11 a 12 años			✓ (Tdap)									✓✓✓ ⁵ La vacuna contra el dengue se recomienda para determinados niños	✓✓ ^{6,7}	✓		La vacuna contra la gripe se recomienda cada año para todas las personas a partir de los 6 meses de edad
13 a 15 años																
16 a 18 años														✓	✓✓ 8,9,10	

- NOTAS**
- 1 Es posible que su hijo no necesite esta dosis dependiendo de la marca de vacuna que utilice su proveedor de atención médica.
 - 2 Los bebés cuya madre no recibió una vacuna contra el VRS durante el embarazo y que sean menores de 8 meses y 0 días deben recibir anticuerpos preventivos contra el VRS (VRS-AcM) antes o durante la temporada de VRS (normalmente de octubre a marzo). Ciertos niños de alto riesgo (de 8 a 19 meses) necesitarán VRS-AcM antes de su segunda temporada de VRS.
 - 3 Esta dosis de DTaP se puede administrar a partir de los 12 meses de edad si han transcurrido 6 meses desde la dosis anterior.

- 4 Por lo general, los niños de 5 años o más solo necesitan una dosis. El número de dosis para niños de 6 meses a 4 años viene determinado por la marca de vacuna.
- 5 Se recomienda a los niños de 9 a 16 años que vivan en Puerto Rico, Samoa Americana, Islas Vírgenes de los EE. UU., Estados Federados de Micronesia, República de las Islas Marshall y la República de Palau, y que tengan infección previa por dengue confirmada en laboratorio que reciban una serie de 3 dosis de la vacuna contra el dengue.
- 6 La vacuna contra el VPH es de rutina a los 11 o 12 años, pero puede iniciarse a los 9 años.

- 7 Los niños con ciertas afecciones médicas necesitarán una tercera dosis.
- 8 Esta vacuna se puede administrar a adolescentes sanos. También se recomienda para adolescentes con ciertas afecciones médicas.
- 9 Su hijo adolescente puede necesitar una dosis adicional dependiendo de la recomendación de su proveedor de atención médica.
- 10 Cuando se necesitan las vacunas MenACWY y MenB, se puede utilizar una vacuna combinada MenABCWY.

