

টিকা-সম্বন্ধীয় তথ্য বিবৃতি

হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ b (Hib)

টিকা: আপনাকে যা জানতে হবে

Many Vaccine Information Statements are available in Bengali and other languages. See www.immunize.org/vis

অনেক টিকা-সম্বন্ধীয় তথ্য বিবৃতি বাংলা এবং অন্যান্য ভাষায় উপলভ্য রয়েছে। www.immunize.org/vis-এ দেখুন

1. কেন টিকা নিতে হবে?

Hib টিকা হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ b (Hib) রোগ প্রতিরোধ করতে পারে।

হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ b বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণের কারণ হতে পারে। এই সংক্রমণগুলি সাধারণত 5 বছরের কম বয়সী শিশুদেরকে প্রভাবিত করে তবে কিছু নির্দিষ্ট চিকিৎসাগত অবস্থা থাকা প্রাপ্তবয়স্কদেরও প্রভাবিত করতে পারে। Hib ব্যাকটেরিয়া হালকা অসুস্থতার কারণ হতে পারে, যেমন কানের সংক্রমণ বা ব্রঙ্কাইটিস, বা তারা রক্তের সংক্রমণের মতো গুরুতর অসুস্থতার কারণ হতে পারে। গুরুতর Hib সংক্রমণ, যাকে “আক্রমণাত্মক Hib রোগ”ও বলা হয়, তার জন্য হাসপাতালে চিকিৎসার প্রয়োজন হয় এবং কখনও কখনও মৃত্যুও হতে পারে।

Hib টিকার আগে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 5 বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে ব্যাকটেরিয়াজনিত মেনিনজাইটিসের প্রধান কারণ ছিল Hib রোগ। মেনিনজাইটিস হল মস্তিষ্ক এবং মেরুদন্ডের আন্তরকের একটি সংক্রমণ। এটি মস্তিষ্কের ক্ষতি এবং বধিরতার কারণ হতে পারে।

Hib সংক্রমণের কারণে আরো যা হতে পারে:

- নিউমোনিয়া
- গলায় সাংঘাতিক ফোলাভাব, যা শ্বাস নেওয়া কষ্টকর করে তোলে
- রক্ত, জয়েন্ট, হাড় এবং হার্টের আবরণের সংক্রমণ
- মৃত্যু

2. Hib টিকা

Hib টিকা সাধারণত 3 বা 4টি ডোজে (ব্র্যান্ডের উপর নির্ভর করে) দেওয়া হয়।

ছোট শিশুদের তাদের Hib টিকার প্রথম ডোজ 2 মাস বয়সে পাওয়া উচিত এবং সাধারণত 12–15 মাস বয়সে সিরিজটি সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়া উচিত।

12 মাস থেকে 5 বছরের মধ্যে বয়সী শিশুরা যারা আগে Hib-এর বিরুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে টিকা পায়নি তাদের 1 বা তার বেশি ডোজ Hib টিকার প্রয়োজন হতে পারে।

5 বছরের বেশি বয়সী শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্করা সাধারণত Hib টিকা পান না, তবে এটি সেইসকল বড় শিশু বা প্রাপ্তবয়স্কর জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে যাদের গ্লীহা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা অপসারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে সিকেল সেল রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, গ্লীহা অপসারণের জন্য অস্ত্রোপচারের আগে, বা অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনের পরে। 5 থেকে 18 বছর বয়সী HIV আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্যও Hib টিকা সুপারিশ করা হতে পারে।

Hib টিকা একটি স্বতন্ত্র টিকা হিসাবে বা একটি সংমিশ্রণ টিকার (এক ধরনের টিকা যা এক শটে একাধিক টিকাকে একত্রিত করে) অংশ হিসাবে দেওয়া যেতে পারে।

Hib টিকা অন্যান্য টিকার সাথে একই সময়ে দেওয়া যেতে পারে।

3. আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে কথা বলুন

আপনার টিকাকরণ প্রদানকারীকে বলুন যদি টিকা গ্রহণকারী ব্যক্তি/ব্যক্তির:

- Hib টিকার পূর্ববর্তী ডোজের পরে কোনো অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে, বা তার কোনো গুরুতর, প্রাণ-সংশয়কারী অ্যালার্জি থাকে

কিছু ক্ষেত্রে, আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী একটি ভবিষ্যত সাক্ষাৎ পর্যন্ত Hib টিকাকরণ স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

সর্দি-কাশির মতো ছোটখাটো অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের টিকা দেওয়া যেতে পারে। মাঝারি বা গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তিদের সাধারণত Hib টিকা নেওয়ার আগে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত।

আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী আপনাকে আরও তথ্য দিতে পারবেন।



U.S. Department of
Health and Human Services
Centers for Disease
Control and Prevention

4. কোনো টিকাজনিত প্রতিক্রিয়ার বুঁকি

- Hib টিকাকরণের পরে যেখানে শট দেওয়া হয়েছে সেখানে লালভাব, গরম হয়ে থাকা, বা ফোলাভাব ঘটতে পারে।

লোকেরা কখনও কখনও টিকাকরণ সহ চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় পদ্ধতিসমূহের পরে অজ্ঞান হয়ে যায়। আপনি যদি মাথা ঘোরা অনুভব করেন বা দৃষ্টিশক্তির পরিবর্তন হয় বা কানের মধ্যে শব্দ হতে থাকে তাহলে আপনার প্রদানকারীকে তা জানান।

যেকোন ওষুধের মতোই, কোনো টিকার মারাত্মক অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া, অন্যান্য গুরুতর আঘাত বা মৃত্যুর কারণ হওয়ার খুব প্রত্যন্ত সম্ভাবনা রয়েছে।

5. যদি কোনো গুরুতর সমস্যা হয় তাহলে কী হবে?

টিকা প্রাপ্ত ব্যক্তি ক্লিনিক ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে একটি অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে। আপনি যদি কোনো গুরুতর অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ দেখেন (আমাবাত, মুখ এবং গলা ফুলে যাওয়া, শ্বাস নিতে অসুবিধা, দ্রুত হৃদস্পন্দন, মাথা ঘোরা বা দুর্বলতা), তাহলে 9-1-1 নম্বরে কল করুন এবং ব্যক্তিটিকে নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যান।

আপনার উদ্বেগের অন্যান্য লক্ষণগুলির জন্য, আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে কল করুন।

প্রতিকূল প্রতিক্রিয়াগুলি টিকার প্রতিকূল ঘটনার রিপোর্টিং সিস্টেম (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS) এর কাছে রিপোর্ট করা উচিত। সাধারণত আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী এই রিপোর্টটি দায়ের করবেন, অথবা আপনি নিজেই এটি করতে পারেন। www.vaers.hhs.gov-এ VAERS ওয়েবসাইটে যান বা 1-800-822-7967 নম্বরে কল করুন। VAERS শুধুমাত্র প্রতিক্রিয়া রিপোর্ট করার জন্য, এবং VAERS কর্মী সদস্যরা চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় পরামর্শ দেন না।

6. জাতীয় টিকাজনিত আঘাতের ক্ষতিপূরণ কর্মসূচী

জাতীয় টিকাজনিত আঘাতের ক্ষতিপূরণ কর্মসূচী (National Vaccine Injury Compensation Program, VICP) হল একটি ফেডারেল প্রোগ্রাম যা নির্দিষ্ট টিকার দ্বারা আহত হতে পারে এমন লোকেদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। টিকাকরণের কারণে তথাকথিত আঘাত বা মৃত্যু সংক্রান্ত দাবিগুলি দায়ের করার জন্য একটি সময়সীমা রয়েছে, যা দুই বছরের মতো কম সময়ের হতে পারে। কর্মসূচীটি সম্পর্কে এবং দাবি দায়ের করার বিষয়ে জানতে www.hrsa.gov/vaccinecompensation-এ VICP ওয়েবসাইটে যান অথবা 1-800-338-2382 নম্বরে কল করুন।

7. আমি কিভাবে আরও জানতে পারি?

- আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে জিজ্ঞাসা করুন।
- আপনার স্থানীয় বা স্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগে কল করুন।
- টিকার প্যাকেজ সন্নিবেশসমূহ এবং অতিরিক্ত তথ্যের জন্য খাদ্য এবং ওষুধ প্রশাসন (Food and Drug Administration, FDA) এর ওয়েবসাইট www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines-এ যান।
- রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করুন (Centers for Disease Control and Prevention, CDC):
 - কল করুন 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) অথবা
 - CDC-এর ওয়েবসাইট www.cdc.gov/vaccines-এ যান।

