

## 疫苗信息声明

# MMR 疫苗(麻疹、腮腺炎和风疹): 须知事宜

## 1. 为何接种疫苗?

MMR 疫苗可以预防麻疹、腮腺炎和风疹。

- **麻疹 (MEASLES, M)** 会导致发热、咳嗽、流鼻涕和眼睛发红、流泪,之后通常伴有全身出现皮疹。它可导致癫痫发作(常伴有发热)、耳部感染、腹泻和肺炎。罕见情况下,麻疹可能导致脑部受损或死亡。
- **腮腺炎 (MUMPS, M)** 可导致发热、头痛、肌痛、疲劳、食欲不振和耳朵下唾液腺肿大和压痛。它可导致耳聋、大脑和/或脊髓表面的覆盖物肿胀、睾丸或卵巢疼痛肿胀和极罕见情况下导致死亡。
- **风疹 (RUBELLA, R)** 可导致发热、喉咙痛、皮疹、头痛和眼部刺激。它可在最多一半青少年和成年女性中导致关节炎。如果一个人在怀孕期间感染了风疹,可导致流产或胎儿具有严重的先天性异常。

大多数接种 MMR 疫苗的人将终生受到保护。疫苗和高疫苗接种率已使得这些疾病在美国变得很不常见。

## 2. MMR 疫苗

儿童需要接种 2 剂 MMR 疫苗,通常接种年龄为:

- 第一剂在 12 至 15 月时接种
- 第二剂在 4 至 6 岁时接种

**6 至 11 个月龄、要前往美国以外地区旅行的婴儿**  
应在出行前接种一剂 MMR 疫苗。这些儿童还应在推荐年龄接种额外 2 个剂量的疫苗接种,以获得长效保护。

**年龄较大的儿童、青少年和成人**如果尚未对麻疹、腮腺炎和风疹有免疫力,也需要接种 1 或 2 剂 MMR 疫苗。您的医务人员可以帮助您确定您需要多少剂。

在腮腺炎爆发情况下,可能建议某些人接种第三剂 MMR 疫苗。

Many vaccine information statements are available in Simplified Chinese and other languages. See [www.immunize.org/vis](http://www.immunize.org/vis)

许多疫苗信息声明均提供简体中文和其他语言的版本。请参阅 [www.immunize.org/vis](http://www.immunize.org/vis)

MMR 疫苗可以和其他疫苗一起接种。12 月龄至 12 岁儿童可能通过单次注射来接种 MMR 疫苗和水痘疫苗,称为 MMRV。您的医务人员可向您提供更多信息。

## 3. 请询问您的医务人员

如果准备接种疫苗者有以下情况,请告诉您的疫苗接种服务提供者:

- 在上次注射 MMR 或 MMRV 疫苗后出现了过敏反应,或有任何重度、危及生命的过敏反应
- 已怀孕或认为自己可能怀孕——孕妇不应接种 MMR 疫苗
- 免疫系统受损,或父母、兄弟或姐妹有遗传性或先天性免疫系统问题史
- 曾患有使其很容易出现瘀伤或流血的病情
- 近期接受过输血或使用过其他血液制品
- 现在患有结核病
- 在过去 4 周内接种过任何其他疫苗

在某些情况下,您的医务人员可能会决定将 MMR 疫苗接种推迟至下次就诊。

患有诸如感冒等轻微疾病的人可以接种疫苗。但对于患有中度或重度疾病的人,应当等康复后再接种 MMR 疫苗。

您的医务人员可向您提供更多信息。

## 4. 疫苗反应的风险

- 接种 MMR 疫苗后,可能会出现手臂疼痛或注射部位发红、发热和轻度皮疹。
- 在接种 MMR 疫苗后,有时会出现脸颊或颈部腺体肿胀或关节暂时疼痛和僵硬(多见于青少年或成年女性)。



U.S. Department of  
Health and Human Services  
Centers for Disease  
Control and Prevention

- 罕见发生更严重的反应。这些可能包括癫痫发作(通常与发热有关)或暂时性血小板计数低,这可能导致异常出血或瘀伤。
- 在有严重免疫系统问题的人中,这种疫苗可能导致危及生命的感染。有严重免疫系统问题的人不应接种MMR疫苗。

人们有时在接受了医疗操作程序(包括接种疫苗)之后会昏厥。如果您感到头晕或视力发生变化或出现耳鸣,请告诉您的医务人员。

和使用任何药物一样,接种疫苗有可能造成严重的过敏反应、其它严重损伤或死亡,但是可能性极小。

## 5. 如果出现严重问题怎么办?

过敏反应可能会发生在接种疫苗的人离开诊所后。如果您看到严重过敏反应的体征(荨麻疹、面部和喉咙肿胀、呼吸困难、心跳加快、头晕或无力),请打电话给9-1-1,并把人送到最近的医院。

如出现其它让您担心的体征,请打电话给您的医务人员。

应将不良反应报告给Vaccine Adverse Event Reporting System(VAERS,疫苗不良事件报告系统)。您的医务人员通常会提交这份报告,或者您可以自己来提交。请访问VAERS网站[www.vaers.hhs.gov](http://www.vaers.hhs.gov),或拨打电话1-800-822-7967。VAERS仅用于报告反应,VAERS工作人员并不给予医疗建议。

## 6. National Vaccine Injury Compensation Program (国家疫苗伤害赔偿计划)

National Vaccine Injury Compensation Program(VICP,国家疫苗伤害赔偿计划)是一项联邦计划,旨在对可能因接种特定疫苗而受到伤害的人进行赔偿。关于声称因疫苗接种而受伤或死亡的索赔有提交时限,最长可能为两年。请访问VICP网站[www.hrsa.gov/vaccinecompensation](http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation),或拨打电话1-800-338-2382,以了解关于该计划的内容,以及关于提出索赔的内容。

## 7. 我如何获得更多的信息?

- 请询问您的医务人员。
- 致电您当地或州健康部门。
- 请访问Food and Drug Administration(FDA,美国食品药品监督管理局)网站,获取疫苗药品说明书和其他信息,网址为[www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines](http://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines)。
- 联系Centers for Disease Control and Prevention(CDC,美国疾病控制与预防中心):
  - 致电1-800-232-4636(1-800-CDC-INFO)或
  - 请访问CDC网站:[www.cdc.gov/vaccines](http://www.cdc.gov/vaccines)。

