

بیانیه اطلاعات واکسن

Many Vaccine Information Statements are available in Farsi and other languages. See www.immunize.org/vis

بسیاری از بیانیه های اطلاعات واکسن به زبان فارسی و زبان های دیگر در دسترس است. به نشانی www.immunize.org/vis زیر مراجعه کنید

واکسن منگوکوک B: آنچه باید بدانید

1. چرا باید واکسن زد؟

واکسن منگوکوک B می تواند به محافظت در برابر بیماری منگوکوک ناشی از سروگروه B کمک کند. واکسن متفاوتی برای منگوکوک در دسترس است که می تواند به محافظت در برابر سروگروه های A، C، W و Y کمک نماید.

بیماری منگوکوک می تواند به مننژیت (عفونت جداره مغز و نخاع) و عفونت خون منجر شود. بیماری منگوکوک، حتی در صورتی که درمان شود از هر 100 فرد آلوده، 10 تا 15 نفر را می کشد. و از میان افرادی که زنده می مانند، حدود 10 تا 20 نفر از هر 100 نفر دچار ناتوانی هایی از قبیل از دست دادن شنوایی، آسیب مغزی، آسیب کلیوی، قطع عضو، مشکلات سیستم عصبی یا زخم های شدید ناشی از پیوند پوست خواهند شد.

بیماری منگوکوک نادر است و از دهه 1990 در ایالات متحده رو به کاهش بوده است. با این حال، این نوع بیماری جدی بوده و با خطر قابل توجه مرگ یا ناتوانی های دائمی در افرادی همراه است که به آن مبتلا می شوند.

هر کسی می تواند به بیماری منگوکوک مبتلا شود. افراد خاصی بیشتر در معرض خطر هستند، از جمله:

- نوزادانی که کمتر از یک سال سن دارند
- نوجوانان و جوانان 16 تا 23 ساله
- افرادی که به بیماری خاصی مبتلا هستند که بر سیستم ایمنی بدن تأثیر می گذارد
- میکروب شناسانی که به طور معمول با نمونه های مختلف آن.
- مننژیتیدیس سر و کار دارند، یعنی همان باکتری که عامل بیماری منگوکوک است
- افرادی که به دلیل شیوع این بیماری در محل زندگی خود، در معرض خطر قرار دارند

2. واکسن منگوکوک B

برای دستیابی به بهترین محافظت، به بیش از 1 دوز واکسن منگوکوک B نیاز است. دو واکسن منگوکوک B در دسترس قرار دارد. می توان از یک واکسن برای همه دوز ها استفاده کرد.

واکسن های منگوکوک B برای افراد 10 ساله یا بزرگتر که در معرض خطر ابتلا به بیماری منگوکوک سروگروه B هستند توصیه می شود، از جمله:

- افراد در معرض خطر به دلیل شیوع بیماری منگوکوک با سروگروه B
- هر کسی که طحالش آسیب دیده یا برداشته شده است، از جمله افراد مبتلا به بیماری سلول داسی شکل
- تمام افرادی که دچار یک بیماری نادر سیستم ایمنی به نام "نقص جزء مکمل" هستند
- هر کسی که نوعی دارو به نام "مهارکننده مکمل" را مصرف می کند، مانند اکولیزوماب® ("Soliris" نیز خوانده می شود) یا راوولیزوماب (که "Ultomiris" هم خوانده می شود)
- میکروب شناسانی که به طور معمول با نمونه های مختلف آن.
- مننژیتیدیس سر و کار دارند

همچنین ممکن است این واکسن ها بر اساس گفتگو بین بیمار و ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی برای افراد 16 تا 23 ساله تجویز شوند تا محافظت کوتاه مدت را در برابر بیشتر گونه های بیماری منگوکوک سروگروه B ایجاد نمایند. سن مطلوب برای واکسیناسیون 16 تا 18 سال است.

3. با ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی خود گفتگو کنید

در صورت وجود موارد ذیل در فرد دریافت کننده واکسن، این موضوع را به ارائه دهنده واکسن اطلاع دهید:

- پس از دوز قبلی واکسن منگوکوک B، واکنش آلرژیک داشته یا هرگونه آلرژی شدید و مرگبار داشته است
- بارداری یا شیردهی است

در برخی موارد، ممکن است ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی تصمیم بگیرد واکسیناسیون منگوکوک B را تا ملاقات بعدی به تعویق بیندازد.



U.S. Department of
Health and Human Services
Centers for Disease
Control and Prevention

ارائه‌دهنده مراقبت‌های بهداشتی شما می‌تواند اطلاعات بیشتری در اختیار تان قرار دهد.

در مورد واکنس نیز مانند هر داروی دیگری، احتمال بسیار اندکی وجود دارد که شخص دچار واکنش شدید آلرژیک، آسیب جدی دیگر یا مرگ شود.

در خصوص سایر علائمی که شمارانگران می‌کند، با ارائه‌دهنده مراقبت‌های بهداشتی خود تماس بگیرد.

