

واکسين د مالوماتو بيانیه

Many vaccine information statements are available in Pashto and other languages. See www.immunize.org/vis

د واکسين د معلوماتو اړوند ډيری بيانونه په پښتو او نورو ژبو کې موجود دي.
www.immunize.org/vis وگورئ.

د انفلونزا (زکام) واکسين (ژوندی، د پوزي دننه): هغه څه چې تاسو بايد پرې پوه شئ

د واکسين له تطبيق څخه وروسته 2 اونۍ وخت نيسي چې خوندیتوب رامنځته شي.

د زکام گڼ شمېر وایرسونه شتون لري، او هغوي تل د بدليدو په حال کې دي. هر کال د زکام نوی واکسين جوړېږي ترڅو د انفلونزا د وایرسونو د هغو ډولونو پر وړاندې خوندیتوب رامنځته کړي چې ښايي د زکام په راتلونکي موسم کې د ناروغۍ لامل وگرځي. حتی کله چې واکسين له دغه وایرسونو سره په صحيح ډول سره مطابقت هم و نه کړي، دا ښايي بیا هم یوه اندازه خوندیتوب برابر کړي.

د انفلونزا واکسين د زکام لامل نه ګرځي.

د انفلونزا واکسين ښايي لکه د نورو واکسينونو په څېر په ورته وخت کې ورکړل شي.

3. د خپل روغتيايي پاملرنې چمتو کونکي سره خبره وکړئ

خپل چمتو کونکي ته ووايئ که چېرې د واکسين تطبيق کونکي کس:

- له 2 کلونو څخه لږ او له 49 کلونو څخه پورته عمر ولري
- امیندواره وي. د انفلونزا ژوندی، رقیق شوی واکسين د امیندواره مېرمنو لپاره نه وړاندیز کيږي
- د انفلونزا واکسين له مخکیني ډوز څخه وروسته یې یو الرژیکي غبرګون څرګند کړي وي، یا یې شدیدې، د ژوند ګواښونکي الرژي ګانې لرلې وي
- داسې یو ماشوم یا نوی ځوان وي چې عمر یې له 2 څخه تر 17 کلونو پورې وي او اسپرین یا اسپرین-یا د سیلیکیت لرونکي محصولات ترلاسه کوي
- کمزوری معافیتي سیستم ولري
- داسې یو ماشوم وي چې عمر یې له 2 څخه تر 4 کلونو پورې وي او په تېرو 12 میاشتو کې د نفس تنګۍ یا د خر خر کولو د غږ تاریخچه ولري
- 5 کلن یا هغه څخه پورته عمر ولري او نفس تنګي ولري
- په تېرو 3 اونیو کې یې د انفلونزا د وایرس ضد درمل خوړلي وي
- د معافیتي سیستم د شدید اختلال لرونکو کسانو چې خوندي چاپیریال ته اړتیا لري، مراقبت کوي
- نور بنسټیز طبي شرایط ولري چې خلک د زکام د جدي عوارضو له لور خطر سره مخ کولای شي (لکه د سپرو ناروغی، د زړه ناروغی، د پډویدو ناروغی لکه شکر، د پډویدو یا ځیګر اختلالات، عصبي یا عصبي عضلاتي یا میتابولیکي اختلالات)

1. ولې واکسين وکړو؟

د انفلونزا واکسين کولای شي چې د انفلونزا (زکام) مخنيوي وکړي.

زکام یوه ساري ناروغي ده چې هر کال معمولاً د اکتوبر او مې میاشتو تر منځ په متحده ایالاتو کې خپرېږي. هر څوک په زکام اخته کېدلی شي، مګر د ځنو خلکو لپاره ډېر خطرناک دی. کوچنيان او ځوان ماشومان، 65 کلن یا هغه څخه ډېر عمر لرونکي کسان، امیندواره مېرمنې، او هغه خلک چې ځینې طبي شرایط یا کمزوري معافیتي سیستم لري، د زکام د عوارضو له جدي خطر سره مخ دي.

سینه و بغل، برونشیت، د پوزي مصابیتونه، او د غوړونو مصابیتونه د زکام اړوند عوارضو له بېلګو څخه عبارت دي. که تاسو یو طبي حالت لرئ، لکه د زړه ناروغي، سرطان، یا شکر، زکام کولای شي چې هغه نور هم بدتر کړي.

زکام کولای شي چې د سارو، د ستوني درد، د عضلاتو درد، سټریا، ټوخي، سردرد، او د رواني یا بندي پوزي لامل وګرځي. ځنې خلک ښايي استفراغ یا نس ناستي ولري، که څه هم دا د لویانو پرتله په ماشومانو کې ډیر عام دی.

په یو اوسط کال کې، په متحده ایالاتو کې زرګونه خلک د زکام له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي، او ګڼ شمېر نور یې په روغتون کې بستر کيږي. د زکام واکسين هر کال په میلیونونه ناروغېو او د زکام له امله ډاکټر ته د تګ مخنیوي کوي.

2. د انفلونزا ژوندی، رقیق شوی واکسين

CDC سپارښتنه کوي چې هر 6 میاشتني او هغه څخه لوی ماشوم باید د زکام په هر موسم کې واکسين شي. هغه ماشومان چې عمر یې له 6 میاشتو څخه تر 8 کلونو پورې وي ښايي د زکام په یو موسم کې 2 ډوزو ته اړتیا ولري. هر بل کس د زکام په هر موسم کې یوازې 1 ډوز ته اړتیا لري.

د انفلونزا ژوندی، رقیق شوی واکسين (چې "LAIV" نومېږي) د پوزي د سپرې له واکسين څخه عبارت ده چې ښايي غیرامیندواره مېرمنو ته چې عمر یې له 2 کلونو څخه تر 49 کلونو پورې وي، ورکړل شي.



U.S. Department of
Health and Human Services
Centers for Disease
Control and Prevention

5. که چېرې کومه جدي ستونزه شتون ولري نو څه؟

وروسته لدې چې واکسين شوی کس کلينيک پرېږدي پدې صورت کې يو الرژيکي غبرگون رامنځته کيدلې شي. که چېرې تاسو د جدي الرژيکي غبرگون علايم (التهابونه، د مخ او ستوني پرسوب، تنفس کې ستونزه، د زړه چټک ضربان، پرکالتوب، يا کمزوري) وگورئ، له 1-9 شمېرې سره اړيکه ونيسئ او اړونده کس تر ټولو نژدې روغتون ته ورسوئ.

د هغو نورو علايمو لپاره چې تاسو اندېښمن کوئ، د خپلې روغتيايي پاملرنې له چمتو کونکي سره اړيکه ونيسئ.

د نا مطلوبو غبرگونونو په اړه بايد د واکسين د نامطلوبو پېښو د راپور ورکولو سيستم (VAERS) ته راپور ورکړل شي. ستاسو د روغتيايي پاملرنې چمتو کونکي به دا راپور ثبت کړي، يا دا کار تاسو په خپله ترسره کولای شئ. د VAERS له وېب پاڼې څخه په www.vaers.hhs.gov کې ليدنه وکړئ يا له 1-800-822-7967 شمېرې سره اړيکه ونيسئ. VAERS يوازې د غبرگونونو د راپور ورکولو لپاره دی، او د VAERS کارکونکي غړي طبي مشوره نه ورکوي.

6. د واکسين د زيان د جبران ملي پروگرام

د واکسين د زيان د جبران ملي پروگرام (VICP) يو فدرال پروگرام دی چې هغو کسانو ته د جبران لپاره جوړ شوی دی چې د ټاکلو واکسينونو پواسطه زيانمن شوي وي. د واکسين د تطبيق له امله د ادعا شوي زيان يا مړينې په اړه ادعاوې د ثبت کولو لپاره د وخت محدوديت لري چې د دوه کلونو په اندازه دی. د VICP له وېب پاڼې څخه په www.hrsa.gov/vaccinecompensation کې ليدنه وکړئ يا 1-800-338-2382 شمېرې سره اړيکه ونيسئ ترڅو د دې پروگرام او د ادعا د ثبتولو په اړه مالومات تر لاسه کړئ.

7. زه مالومات څنگه ترلاسه کولای شم؟

- د خپلې روغتيايي پاملرنې له چمتو کونکي څخه پوښتنه وکړئ.
- له خپلې سيمه ايزې يا ايالتي روغتيايي څانگې سره اړيکه ونيسئ.
- د واکسين د بستې او لا ډېرو مالوماتو لپاره د خوارو او درملو د ادارې (FDA) له وېب پاڼې څخه په www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines کې ليدنه وکړئ.
- د ناروغېو د کنټرول او مخنيوي له مرکزونو (CDC) سره اړيکه ونيسئ:
- د 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) شمېرې سره اړيکه ونيسئ يا
- د CDC له وېب پاڼې څخه په www.cdc.gov/flu کې ليدنه وکړئ.

• توري و نه لري، يا غيرفعال توري ولري

• حلزوني کښت (د غوړ اوريدو وسيله) ولري

• د مغزي نخاعي مايع ليکي (د هغې مايع ليکي چې ماغزه له پوزې، ستوني، غوړ، يا په سر کې له يو بل موقعيت سره احاطه کوي) ولري

• د انفلونزا د واکسين له مخکېني ډوز څخه وروسته يې د 6 اونډو دننه د گيلن باري سندروم لرلی وي

په ځنو مواردو کې، ستاسو د روغتيايي پاملرنې چمتو کونکي بنايي پرېکړه وکړي چې د انفلونزا واکسين تر راتلونکې ليدنې پورې وځنډوي.

د ځنو ناروغانو لپاره، بنايي د انفلونزا د واکسين بل ډول (د انفلونزا غيرفعال شوی يا ترکيبي واکسين) د انفلونزا د ژوندي، رقيق شوي واکسين پرتله ډېر مناسب وي.

د کوچنيو ناروغيو لکه زکام لرونکي کسان، بنايي واکسين شي. هغه کسان چې لږ يا ډېر ناروغ دي بايد په معمول ډول سره د انفلونزا د واکسين له تطبيقولو څخه وړاندې د صحتمنده کيدو تر مودې پورې صبر وکړي.

ستاسو د روغتيايي پاملرنې چمتو کونکي تاسو ته لا ډېر مالومات درکولای شي.

4. د يو واکسين د غبرگون خطرونه

- LAIV واکسين له تطبيق څخه وروسته روانه يا بنده پوزه، د خر خر غږ، او سردرد رامنځته ته کيدلی شي.
- استفراغ، د عضلاتو درد، تبه، د ستوني درد، او ټوخی نور احتمالي جانبي عوارض دي.

که چېرې دا ستونزې رامنځته شي، هغه معمولاً د واکسين له تطبيق څخه وروسته ژر پيلېږي او دا ستونزې خفيفې او لنډمهاله وي.

له هر ډول درملو سره، د يو واکسين لپاره خورا لږې چانس شتون لري چې د شديد الرژيکي غبرگون، يا بل جدي زيان، يا مړينې لامل وگرځي.

