

واکسين د مالوماتو بيانیه

Many vaccine information statements are available in Pashto and other languages. See www.immunize.org/vis

د واکسين د معلوماتو اړوند ډيری بيانونه په پښتو او نورو ژبو کې موجود دي. www.immunize.org/vis وگورئ.

د انفلونزا د هيموفيلوس د b ډول (Hib) واکسين: هغه څه چې تاسو بايد پرې پوه شئ

1. ولې واکسين وکړو؟

د Hib واکسين کولای شي چې د انفلونزا د هيموفيلوس د b ډول (Hib) ناروغی مخنيوي وکړي.

د انفلونزا د هيموفيلوس b ډول کولای شي چې د مصابيتونو د بېلابېلو ډولونو لامل وگرځي. دغه مصابيتونه معمولاً 5 کلنو څخه بنديته عمر لرونکي ماشومان اغيزمن کوي مگر هغه لويان چې ټاکلي طبي شرايط ولري هم اغيزمن کولای شي. د Hib بکتريا کولای شي چې د خفيفې ناروغۍ، لکه د غوړ مصابيتونه يا برونشيت لامل وگرځي، يا کولای شي چې د شديدې ناروغۍ، لکه د وينې د مصابيتونو لامل وگرځي. د Hib مصابيت، چې "د Hib د بريدگرې ناروغۍ" په نوم يادېږي، په روغتون کې درملنې ته اړتيا لري او ځنې وختونه د مړينې پايله لري.

د Hib واکسين څخه وړاندې، په متحده ايالاتو کې له 5 کلنو څخه لږ عمر لرونکو ماشومانو ترمنځ د Hib ناروغي د بکتريايي مننژيت اصلي لامل وو. مننژيت د مغزو او شوکي نخاع د طبقې له مصابيت څخه عبارت ده. دا د ماغزو د زيان او کونوالي لامل گرځيدلی شي.

د Hib مصابيت د لاندې مواردو لامل هم گرځيدلی شي:

- سينه و بغل
- د ستوني شديد پړسوب چې تنفس کول ستونزمن کوي
- د وينې، مفصلونو، هډوکو، او د زړه د پوښې مصابيتونه
- مړينه

2. د Hib واکسين

د Hib واکسين معمولاً 3 يا 4 ډوزونو کې (د برانډ په پام کې نيولو سره) ورکول کېږي.

کوچنيان معمولاً خپل د Hib واکسين لومړی ډوز د 2 مياشتو په عمر کې ترلاسه کوي او د دغه واکسين لړۍ معمولاً د 12-15 مياشتو په عمر کې بشپړوي.

هغه ماشومان چې عمر يې د 12 مياشتو او 5 کلونو تر منځ وي او پخوا يې د Hib واکسين بشپړ کړې نه وي بنسټي د Hib واکسين 1 يا ډيرو ډوزونو ته اړتيا ولري.

له 5 کلونو څخه ډېر عمر لرونکي ماشومان او لويان معمولاً د Hib واکسين نه ترلاسه کوي، مگر دا واکسين بنسټي د توري د لري کولو له عملياتو څخه وړاندې، يا د هډوکو د مغزو له کښت څخه وروسته، د هغو خلکو په گډون چې د حجرې د نيمايي دايرې ناروغي ولري، د هغو لويو ماشومانو يا لويانو لپاره وړاندېز شي چې توري يې تخریب شوي وي يا لري شوي وي. د Hib واکسين بنسټي د هغو 5 څخه تر 18 کلنو افرادو لپاره وړاندېز شي چې په HIV اخته وي.

د Hib واکسين بنسټي د يو خپلواک واکسين په توگه، يا د ترکيبي واکسين (هغه ډول چې له يو څخه ډېر واکسينونه په يوې پيچکارۍ کې يو ځای کوي) د برخې په توگه ورکړل شي.

د Hib واکسين بنسټي لکه د نورو واکسينونو په څېر په ورته وخت کې ورکړل شي.

3. د خپل روغتيايي پاملرنې چمتو کونکي سره خبره وکړئ

خپل چمتو کونکي ته ووايئ که چېرې د واکسين تطبيق کونکي کس:

- د Hib واکسين له مخکيني ډوز څخه وروسته يې يو الرژيکي غبرگون څرگند کړي وي، يا يې کومه شديده، د ژوند گواښونکي الرژي څرگنده کړې وي

په ځنو مواردو کې، ستاسو د روغتيايي پاملرنې چمتو کونکي بنسټي پريکړه وکړي چې د Hib واکسين تر راتلونکي ليدنې پورې وځنډوي.

د کوچنيو ناروغيو لکه زکام لرونکي کسان، بنسټي واکسين شي. هغه کسان چې لږ يا ډېر ناروغ دي بايد په معمول ډول سره د Hib واکسين له تطبيقولو څخه وړاندې د صحتمنده کيدو تر مودې پورې صبر وکړي.

ستاسو د روغتيايي پاملرنې چمتو کونکي تاسو ته لا ډېر مالومات درکولای شي.



U.S. Department of
Health and Human Services
Centers for Disease
Control and Prevention

4. د یو واکسین د غبرگون خطرونه

• د Hib واکسین له تطبیقولو څخه وروسته د تزریق په ځای کې سوروالي، گرمي، او پرسوب رامنځته کیدلې شی.

خلک کله نا کله، د واکسین کولو په ګډون، له طبي اقداماتو څخه وروسته بېهوښه کېږي. که چېرې تاسو د ګنګس توب یا د لید د بدلونونو یا غوړونو کې د زنگ د آواز احساس کوئ، پدې اړه خپل چمتو کونکي ته ووايئ.

له هر ډول درملو سره، د یو واکسین لپاره خورا لږې چانس شتون لري چې د شدید الرژیکي غبرګون، یا بل جدي زیان، یا مړینې لامل وګرځي.

5. که چېرې کومه جدي ستونزه شتون ولري نو څه؟

وروسته لدې چې واکسین شوی کس کلینیک پرېږدي پدې صورت کې یو الرژیکي غبرګون رامنځته کیدلې شي. که چېرې تاسو د جدي الرژیکي غبرګون علایم (التهابونه، د مخ او ستوني پرسوب، تنفس کې ستونزه، د زړه چټک ضربان، پرکالتوب، یا کمزوري) وګورئ، له 1-9 شمېرې سره اړیکه ونیسئ او اړونده کس تر ټولو نژدې روغتون ته ورسوئ.

د هغو نورو علایمو لپاره چې تاسو اندېښمن کوئ، د خپلې روغتيايي پاملرنې له چمتو کونکي سره اړیکه ونیسئ.

د نا مطلوبو غبرګونونو په اړه باید د واکسین د نامطلوبو پېښو د راپور ورکولو سیسټم (VAERS) ته راپور ورکړل شي. ستاسو د روغتيايي پاملرنې چمتو کونکي به دا راپور ثبت کړي، یا دا کار تاسو په خپله ترسره کولای شئ. د VAERS له وېب پاڼې څخه په www.vaers.hhs.gov کې لیدنه وکړئ یا له 1-800-822-7967 شمېرې سره اړیکه ونیسئ. VAERS یوازي د غبرګونونو د راپور ورکولو لپاره دی، او د VAERS کارکونکي غړي طبي مشوره نه ورکوي.

6. د واکسین د زیان د جبران ملي پروګرام

د واکسین د زیان د جبران ملي پروګرام (VICP) یو فدرال پروګرام دی چې هغو کسانو ته د جبران لپاره جوړ شوی دی چې د ټاکلو واکسینونو پواسطه زیانمن شوي وي. د واکسین د تطبیق له امله د ادعا شوي زیان یا مړینې په اړه ادعاوې د ثبت کولو لپاره د وخت محدودیت لري چې د دوه کلونو په اندازه دی. د VICP له وېب پاڼې څخه په www.hrsa.gov/vaccinecompensation کې لیدنه وکړئ یا 1-800-338-2382 شمېرې سره اړیکه ونیسئ ترڅو د دې پروګرام او د ادعا د ثبتولو په اړه مالومات تر لاسه کړئ.

7. زه مالومات څنګه ترلاسه کولای شم؟

- د خپلې روغتيايي پاملرنې له چمتو کونکي څخه پوښتنه وکړئ.
- له خپلې سیمه اییزې یا ایالتي روغتيايي څانګې سره اړیکه ونیسئ.
- د واکسین د بستې او لا ډېرو مالوماتو لپاره د خوارو او درملو د ادارې (FDA) له وېب پاڼې څخه په www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines کې لیدنه وکړئ.
- د ناروغېو د کنټرول او مخنیوي له مرکزونو (CDC) سره اړیکه ونیسئ: - د 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) شمېرې سره اړیکه ونیسئ یا - د CDC له وېب پاڼې څخه په www.cdc.gov/vaccines کې لیدنه وکړئ.

