

AŞI BİLGİLENDİRME BEYANI

Tifo Aşısı:

Bilmeniz Gerekenler

Many Vaccine Information Statements are available in Spanish and other languages. See www.immunize.org/vis

Hojas de información sobre vacunas están disponibles en español y en muchos otros idiomas. Visite www.immunize.org/vis

1 Neden aşı olalım?

Tifo aşısı tifo ateşini önleyebilir.

Hem aktif olarak tifo ateşi hastalığına yakalananlar hem de tifo ateşi hastalığına neden olan bakterileri taşıyan kişiler bakterileri diğer insanlara bulaştırabilirler. Kişi mikroplu yiyecekleri yediğinde veya mikroplu içecekleri içtiğinde, bakteriler çoğalabilir ve kan dolaşımına yayılabilir, bu da tifo ateşine neden olur.

Tifo ateşi hayatı tehdit eden bir hastalık olabilir. Belirtiler inatçı yüksek ateş, güçsüzlük, karın ağrısı, baş ağrısı, ishal veya kabızlık, öksürük ve iştahsızlığı içerir.

Tedavi görmeyen kişilerde ateş haftalarca veya aylarca devam edebilir. Tedavi görmeyenlerin %30 kadarı tifo ateşi hastalığının komplikasyonlarından ölmektedir. İlaça dirençli tifo bakterileri dünyanın pek çok yerinde daha yaygın hale geldiği için daha az antibiyotik tedavi seçeneği vardır.

Tifo ateşi bazı Doğu ve Güneydoğu Asya, Afrika, Karayipler ve Orta ve Güney Amerika bölgeleri de dahil olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde yaygındır. Tifo ateşi Birleşik Devletler'de yaygın değildir.

2 Tifo aşısı

Tifoyu önlemek için iki aşı vardır. Biri inaktif (öldürülmüş) aşı ve diğeri canlı, atenüe (zayıflatılmış) aşıdır. Sağlık uzmanınız, hangi tip tifo aşısının sizin için en uygun olduğuna karar vermenize yardımcı olabilir.

- **İnaktif tifo aşısı**, enjeksiyon (iğne) olarak uygulanır. 2 yaş ve üstü insanlara uygulanabilir. Seyahatten en az 2 hafta önce bir doz tavsiye edilir. Risk altında kalmaya devam eden kişiler için her 2 yılda bir tekrarlanan dozlar önerilmektedir.

- **Canlı tifo aşısı** oral olarak (ağız yoluyla) uygulanır. 6 yaş ve üstü kişilere verilebilir. Toplam 4 kapsül olmak üzere birer gün ara ile bir kapsül alınır. Son doz seyahatten en az 1 hafta önce alınmalıdır. Her bir kapsül soğuk veya ılık su ile yemeklerden yaklaşık bir saat önce bütün olarak yutulmalıdır (çiğnenmemeli). Risk altında kalmaya devam eden kişiler için her 5 yılda bir rapel aşıya ihtiyaç vardır. **Önemli: Canlı tifo aşısı kapsülleri bir buzdolabında (dondurulmadan) saklanmalıdır.**

Birleşik Devletler'de rutin tifo aşısı önerilmemektedir, ancak aşağıdaki kişiler için tifo aşısı önerilmektedir:

- Dünyanın tifo yaygın olduğu bazı yerlerine seyahat edenler. (NOT: tifo aşısı %100 etkili değildir ve ne yediğiniz veya içtiğinize dikkat etmenin yerine geçmez.)
- Tifo taşıyıcısı olan biriyle yakın temas halindeki kişiler.
- Salmonella typhi bakterileri ile çalışan laboratuvar çalışanları.

Tifo aşısı diğer aşılar ile aynı anda verilebilir.

3 Sağlık uzmanınızla konuşunuz

Aşı uygulanan kişide şu durumlar mevcutsa sağlık uzmanınızla konuşunuz:

- **Daha önce yapılan bir tifo aşısından sonra bir alerjik reaksiyon** geçirmiş ise veya herhangi bir **şiddetli, hayatı tehdit eden alerjisi** varsa.
- **Zayıflamış bir bağışıklık sistemi** varsa.
- **Hamile** ise veya **emziriyorsa** ya da gebe kalmış olabileceğini düşünüyorsa.
- **Yakın zamanda antibiyotik veya sıtma ilaçları kullandıysa ya da halen kullanıyorsa.**



Bazı durumlarda, sađlık uzmanınız tifo ařilamasını gelecekteki bir viziteye ertelemeye karar verebilir.

Sođuk algınlıđı gibi hafif bir hastalıđı olan kiřiler ařı olabilir. Orta veya ciddi derecede hasta olanlar tifo ařısını almak iin genellikle iyileřinceye kadar beklemelidirler.

Sađlık uzmanınız size daha fazla bilgi verebilir.

4 Ařı reaksiyonu riskleri

- İnaktif tifo ařısından sonra ateř, bař ađrısı ve genel bir rahatsızlık hissi ve enjeksiyon blgesinde ađrı, kızarıklık veya řiřlik ortaya ıkabilir.
- Canlı tifo ařısından sonra ateř, bař ađrısı, karın ađrısı, ishal, bulantı ve kusma grlebilir.

İnsanlar bazen ařı da dâhil olmak zere, tıbbi iřlemlerden sonra bayılabilirler. Bařınız dnerse veya grme deđiřikliđiniz ya da kulaklarınızda ınlama olursa sađlık uzmanınıza bildiriniz.

Herhangi bir ila gibi bir ařının da ađır bir alerjik reaksiyona, diđer ciddi bir tıbbi hasara ya da lme neden olma ihtimali ok dřk olsa da vardır.

5 Ciddi bir problem olursa?

Alerjik bir reaksiyon ařılanan kiři klinikten ayrıldıktan sonra meydana gelebilir. Eđer ciddi alerjik reaksiyon belirtileri (kurdeřen, yzn ve bođazın řiřmesi, nefes darlıđı, hızlı kalp atıřı, sersemlik veya gszlk) grrseniz **9-1-1**'i arayınız ve kiřiyi en yakın hastaneye gtrnz.

Sizi endiřelendiren diđer belirtiler iin sađlık uzmanınızı arayınız.

Olumsuz reaksiyonlar "Ařı Sonrası Olumsuz Olay Bildirim Sistemi" ne (VAERS) bildirilmelidir. Sađlık uzmanınız genellikle bu durumu bildirecektir, fakat bunu kendiniz de yapabilirsiniz. **www.vaers.hhs.gov** adresindeki VAERS web sitesini ziyaret ediniz veya **1-800-822-7967** numaralı telefonu arayınız. *VAERS sadece reaksiyonları bildirmek iindir ve VAERS personeli tıbbi tavsiye vermez.*

6 Nasıl daha fazla bilgi edinebilirim?

- Sađlık uzmanınıza danıřınız.
- Yerel ya da devlet sađlık birimlerini arayınız.
- Hastalık Kontrol ve nleme Merkezleri (CDC) ile temas kurunuz:
 - **1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO)** numaralı telefonu arayınız ya da
 - CDC'nin **www.cdc.gov/typhoid-fever/typhoid-vaccination.html** tifo web sitesini ziyaret ediniz.

