

וואקצין אינפארמאציע סטעיטמענט

Many Vaccine Information Statements are available in Yiddish and other languages. See www.immunize.org/vis

פיל וואקסין אינפארמאציע סטעיטמענט זענען אוועילעבלי אין אידיש און אנדערע שפראכן. זעט www.immunize.org/vis

COVID-19 וואקצין: וואס איר דארפט וויסן

2. COVID-19 וואקצין

די דערהיינטיקסטע COVID-19 2025-2024 וואקצין איז רעקאמענדירט פאר אלעמען פון 6 מאנאטן אלט און עלטער. דאס שליסט איין מענטשן וואס שוואנגערן, ברעסטפיידינג, פרובירן צו פארשוואנגערן, אדער וועלכע וועלן שוואנגערן אין צוקונפט.

COVID-19 2024-2025 וואקציןען פאר פיצל קינדער און קינדער פון 6 מאנאטן ביז 11 יאר אלט זענען פאראנען לויט עמערדזשענסי ניצן אויטאריזאציע פון די U.S. שפיז און דראג פארוואלטונג (Food and Drug Administration, FDA). ביטע גייט צו די פאקט בויגס פאר דערהאלטער און קעיר-געבער פאר מער אינפארמאציע.

פאר מענטשן 12 יאר אלט און עלטער, COVID-19 2025-2024 וואקציןען, פראדוצירט ביי ModernaTX, Inc, Pfizer, Inc, זענען באשטעטיקט ביי FDA.

Novavax COVID-19 Vaccine Adjuvanted (וואקצין אדזשוואנטיד) (2025-2024 פארמולא) וואקצין איז פאראנען לויט עמערדזשענסי ניצן אויטאריזאציע פון דעם FDA פאר מענטשן פון 12 יאר אלט און עלטער. ביטע גייט צו די פאקט בויגס פאר דערהאלטער און קעיר-געבער פאר מער אינפארמאציע.

יעדער פון 6 מאנאטן אלט און עלטער ווערט רעקאמענדירט צו באקומען אן עלטער-צוגעפאסטע FDA-באשטעטיקטע און אויטאריזירטע דערהיינטיקסטע COVID-19 2025-2024 וואקצין.

געוויסע מענטשן אַזוויי די וואס האבן מעדיצינישע צושטאנדן אדער נעמען מעדיצינען וואס ווירקן אויף דעם אימונע סיסטעם, מעגן דארפן ווייטערדיקע דאזעס פון COVID-19 וואקצין. אייער געזונטהייט קעיר צושטעלער קען אייך זאגן וואס צו טוהן.

1. פארוואס וואקצינירט ווערן?

COVID-19 וואקצין קען פארמיידן COVID-19 קראנקייט. וואקסינאציע קען העלפן פארקלענערן די שוועריקייט פון COVID-19 קראנקייט אויב איר ווערט קראנק.

COVID-19 איז פארשאפן ביי א קאראנאווירוס גערופן SARS-CoV-2 וואס פארשפרייט זיך גרינג פון מענטש צו מענטש. COVID-19 קען זיין מילד צו מעסיק, קען דויערן בלויז עטלעכע טעג, אדער עס קען זיין שווער, באדארפן שפיטאליזאציע, אינטענסיווע אפהיטונג, אדער א ווענטילאטאר כדי צו העלפן מיט אטעמען. COVID-19 קען דערפירן צו טויטפאל.

COVID-19 סימפטאמען קענען זיך באווייזן 2 ביז 14 טעג נאכן זיין אויסגעשטעלט צו דעם ווירוס. מען קען האבן מילדע, מעסיקע אדער שווערע סימפטאמען.

מעגלעכע סימפטאמען קענען ארייננעמען פיבער אדער ציטערן, הוסט, קורצער אטעם אדער שוועריקייט צו אטעמען, מידקייט (זיין פארמאטערט), מוסקל אדער קערפער ווייטיקן, קאפ ווייטיק, נייע אנווער פון טעם אדער שמעקן, האלדזווייטיק, פארשטאפטע אדער רינען פון נאז, עקל; ברעכן; און שילשול.

מער ערנסטע סימפטאמען קענען ארייננעמען פראבלעמען צו אטעמען, נאכאנאנד ווייטיק אדער דריקונג אין ברוסטקאסטן, נייע צעמישונג, אוממעגלעכקייט צו זיין וואך אדער בלייבן וואך, בלאסע, גרויע אדער בלויזע הויט, ליפן, אדער נעגל בעטן, (אפהענגיק פון הויט טאן).

עלטערע דערוואקסענע און מענטשן אין יעדן עלטער מיט געוויסע אונטערליגנדע מעדיצינישע צושטאנדן (אזוויי הארץ אדער לונג קראנקייט אדער צוקערקענק) האבן מער שאנסן צו ווערן זייער קראנק פון COVID-19.

נאך COVID-19 קראנקייט, האבן געוויסע מענטשן לאנג COVID, א כראנישע צושטאנד מיט סימפטאמען וואס דויערן 3 מאנאטן אדער לענגער. סימפטאמען פון לאנג COVID קענען ווערן בעסער, ערגער, אדער בלייבן די זעלבע.

מענטשן וואס זענען דערהיינטיקט מיט זייער COVID-19 וואקסינאציע האבן א קלענערע געפאר פון שווערע קראנקייט, שפיטאליזאציע, און שטארבן פון COVID-19 ווי מענטשן וואס זענען נישט דערהיינטיקט. COVID-19 וואקסינאציע איז דער בעסטער אופן צו פארמיידן לאנג COVID.

באקומען א COVID-19 וואקצין העלפט דעם קערפער לערנען וויאזוי צו באשיצן זיך פון דער קראנקייט און פארקלענערן דעם געפאר פון שווערע קראנקייט און קאמפליקאציעס. אחוץ דעם, COVID-19 וואקציןען קענען געבן מער פארהיטונג פאר מענטשן וואס האבן שוין געהאט COVID-19, איינשליסליך פארהיטונג פון שפיטאליזאציע אויב זיי ווערן ווידער אנגעשטעקט מיט COVID-19.



U.S. CENTERS FOR DISEASE
CONTROL AND PREVENTION

3. רעדט מיט אייער געזונטהייט קעיר צושטעלער

- זאגט אייער וואקסינאציע צושטעלער אויב דער מענטש וואס באקומט די וואקצין:
- האט געהאט אן אלערגישע רעאקציע נאך א פריערדיקע דאזע פון די COVID-19 וואקצין אדער האט סיי וועלכע ערנסטע, לעבנס-דראענדע אלערגיעס
- האט געהאט מיאקארדיטיס (אנצידנדג פון דעם הארץ מוסקל) אדער פעריקארדיטיס (אנצידנדג פון דעם אונטערשלאק אינדוריסן פון דעם הארץ)
- האט געהאט מולטיסיסטעם פארצינדונג סינדראם (גערופן MIS-C אין קינדער און MIS-A אין דערוואקסענע)
- אין געוויסע פאלן, וועט אייער געזונטהייט קעיר צושטעלער באשליסן צו אפשטופן COVID-19 וואקסינאציע ביז א צוקונפטיגע באזוך.
- מענטשן מיט מינערווערטיקע קראנקייטן, אזוי ווי פארקילונג, מעגן וואקצינירט ווערן. מענטשן וואס זענען מיטלמעסיק אדער ערנסט קראנק, איינשליסלעך מיט COVID-19, דארפן געוויינטלעך ווארטן ביז זיי קומען צוריק צו זיך.
- די COVID-19 וואקצין מעג געגעבן ווערן אין דעם זעלבן צייט פון אנדערע וואקצינען.

4. ריזיקעס פון א וואקצין רעאקציע

- ווייטיק, געשווילעכץ, און רויטקייט אוואו מען גיט די וואקצין, פֿיבער, פארמאטערטיקייט (מידקייט), קאפ ווייטיק, ציטערן, מוסקל ווייטיק, געלענק ווייטיק, עקל, ברעכן, און געשוואלענע לימפע נאדעס קענען געשען נאך COVID-19 וואקסינאציע.
- מיאקארדיטיס (אנצידנדג פון דעם הארץ מוסקל) און פעריקארדיטיס (אנצידנדג פון דעם אונטערשלאק אינדוריסן דעם הארץ) האט מען זעלטן געזען נאך COVID-19 וואקסינאציע. די דאזיקע ריזיקעס האט מען באמערקט מערסט אפט ביי אדאלעסצענטן און יונגע דערוואקסענע מענער. דער געלעגנהייט פון דאס זאל געשען איז נידעריק.
- עס קען געשען אז מענטשן חלש'ן נאך מעדיצינישע פראצעדורן, אריינגענומען וואקסינאציע. זאגט אייער צושטעלער אויב איר זייט שווינדליק אדער האט זעאונג ענדערונגען אדער איר הערט קלינגען אין די אויערן.

פונקט ווי מיט יעדע מעדיצין, עס איז דא א קליינע אויסזיכט אז א וואקצין זאל פארשאפן א שווערע אלערגישע רעאקציע, אנדערע ערנסטע שעדיגונג, אדער טויט.

V-safe איז א זיכערהייט נאכפאלגונג סיסטעם וואס לאזט אייך מיטטיילן מיט די CDC וויאזוי איר, אדער אנדערע אויף וועמען איר זענט פאראנטווארטליך, פילן נאכן באקומען א COVID-19 וואקצין. איר קענט געפֿינען אינפארמאציע און זיך איינשרייבן אין V-Safe ביי vsafe.cdc.gov.

5. וואס אויב עס איז דא אן ערנסטן פראבלעם?

אן אלערגישע רעאקציע קען פארקומען נאכדעם וואס דער מענטש וואס האט באקומען די וואקצין פארלאזט די קליניק. אויב איר זעט סימנים פון אן ערנסטע אלערגישע רעאקציע (אויסשלאגן, אן אויפגעשוואלענע פנים און האלז, שוועריגקייט צו אטעמען, א שנעלע הארץ קלאפ, א שווינדל, אדער שוואכקייט), רופט 9-1-1 און נעמט דעם מענטש צו דעם נאענסטן שפיטאל.

זוכט באלדיקע מעדיצינישע אפהיטונג אויב דער וואקצינירטע מענטש האט ברוסטקאסטן ווייטיק, א קורצער אטעם אדער פילט א שנעלע-הארצקלאפ, פלאטערן אדער הארץ האמערן נאך די COVID-19 וואקסינאציע. די קענען זיין סימפטאמען פון מיאקארדיטיס אדער פעריקארדיטיס.

פאר אנדערע סימנים וואס פארזארגן אייך, קלינגט אייער געזונטהייט קעיר צושטעלער.

אומגעוויינטשענע רעאקציעס דארף מען באריכטן צו דעם וואקצין אומגעוויינטשענע געשעעניש באריכטונג סיסטעם (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS). אייער געזונטהייט קעיר צושטעלער וועט געווענטליך אריינגעבן דעם באריכט, אדער איר קענט דאס טוהן אליין. באזוכט די VAERS וועבזייטל אויף www.vaers.hhs.gov אדער רופט 1-800-822-7967. VAERS איז בלויז פאר באריכטן רעאקציעס, און VAERS שטאב מיטגלידער געבן נישט קיין מעדיצינישע עצות.

6. שוץ מאסנאמען שאדן פארגיטיקונג פראגראם (Countermeasures Injury Compensation Program)

די שוץ מאסנאמען שאדן פארגיטיקונג פראגראם (CICP) איז א פעדעראלע פראגראם וואס קען העלפן באצאלן פאר קאסטן פון מעדיצינישע קעיר און אנדערע ספעציפישע אויסגאבן פון געוויסע מענטשן וואס זיינען געשעדיקט געווארן דורך געוויסע מעדיצינישע אדער וואקצינען, אריינגענומען די וואקצין. אין אלגעמיין, מען קען אריינלייגן א קלעים צו דעם CICP ביז איין (1) יאר פון די דאטע ווען מען באקומט די וואקצין. כדי צו לערנען מער וועגן דעם פראגראם, באזוכט דעם וועבזייטל פון פראגראם אויף www.hrsa.gov/cicp, אדער קלינגט 1-855-266-2427.

7. ווי אזוי קען איך לערנען מער?

- פרעגט אייער געזונטהייט קעיר צושטעלער.
- קלינגט אייער לאקאלע אדער שטאט געזונטהייט דעפארטמענט.
- באזוכט דעם וועבזייטל פון דעם שפיטאל און דראג פארוואלטונג (Food and Drug Administration, FDA) פאר COVID-19 פאקט בלעטלעך, פעקל אינסערט, און ווייטערדיקע אינפארמאציע אויף www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/covid-19-vaccines.
- קאנטאקטירט די צענטערס פאר קראנקייט קאנטראל און פארמיידונג (Centers for Disease Control and Prevention, CDC):
 - רופט 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) אדער
 - באזוכט דעם COVID-19 וואקצינען וועבזייטל ביי www.cdc.gov/covid/vaccines/index.html

Yiddish translation provided by Immunize.org

